

24615-2025100-10361



DELPHION

RESEARCH

PRODUCTS

INSIDE DELPHION



My Account

Search: Quick/Number Boolean Advanced Derwent Help

The Delphion Integrated View: INPADOC Record

Get Now: ☒ PDF | More choices...

Tools: Add to Work File:

View: Jump to:

☒ Email this to a friend

Title: JP60078529A2: DOUGH SHEET

Country: JP Japan

Kind: A2 Document Laid open to Public inspection

Inventor: OOTA YOSHINORI;  
INOUE SEIJIROU;



High Resolution

Assignee: KYOWA HAKKO KOGYO KK

[News, Profiles, Stocks and More about this company](#)

Published / Filed: 1985-05-04 / 1983-10-07

Application Number: JP1983000187757

IPC Code: A21D 8/04; A21D 2/26;

ECCLA Code: None


Priority Number: 1983-10-07 JP1983000187757

Family:

PDF	Publication	Pub. Date	Filed	Title
<input checked="" type="checkbox"/>	JP60078529A2	1985-05-04	1983-10-07	DOUGH SHEET

1 family members shown above

Other Abstract Info: None



[Nominate this for the Gallery...](#)



**THOMSON**

Copyright © 1997-2005 The Thomson Corporation  
[Subscriptions](#) | [Web Seminars](#) | [Privacy](#) | [Terms & Conditions](#) | [Site Map](#) | [Contact Us](#) | [Help](#)

## ⑫ 公開特許公報(A)

昭60-78529

⑪ Int.Cl.<sup>4</sup>A 21 D 8/04  
2/26

識別記号

庁内整理番号

6712-4B  
6712-4B

⑬ 公開 昭和60年(1985)5月4日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

⑭ 発明の名称 生地

⑮ 特 願 昭58-187757

⑯ 出 願 昭58(1983)10月7日

⑰ 発 明 者 太 田 恵 教 狛江市岩戸北3-6-17

⑱ 発 明 者 井 上 誠 二 郎 町田市旭町3-6-6

⑲ 出 願 人 協和醗酵工業株式会社 東京都千代田区大手町1丁目6番1号

## 明 細 書

## 1. 発明の名称

生地

## 2. 特許請求の範囲

フォスフォリパーゼAを小麦粉1Kgあたり150単位以上含有する

小麦粉生地。

## 3. 発明の詳細な説明

本発明はフォスフォリパーゼAを小麦粉1Kgについて150単位以上含有する(以下、PL-Aと略称する)生地に関する。

該生地からめん類例えばうどん、そば、中華めん、マカロニ、スパゲッティ又、ぎょうざ、しょうまいの皮等調製すると優れた効果を奏する。

めん類は代表的な穀粉食品の1つである。近年その生産、流通、消費形態等の変化に伴い、めん類の製造にはいくつかの改善が要望されている。例えば、大量機械生産の際のめん生地への機械耐性の付与、茹でる時の溶出固形分の低下による歩留りの向上と廃水汚染の軽減、さらに茹

で上げ、又は、蒸煮後の食味品質低下の抑制等が強く要望されている。

これ等の要望に対して、乳化剤、澱粉、蛋白質等の添加が行われているが、まだ十分な効果を発揮する技術は開発されていない。

穀類粉、特に小麦粉の食品加工適性について検討の結果、穀類粉中のリン脂質にPL-Aを作用させることにより得られる生地の性質、穀類粉のめん類加工適性が向上し、製品品質が改善されることが見い出された。即ち、PL-A添加により、生地の機械耐性が改善されこの生地を用いてめん類を製造しためん類の加熱時の歩留りが向上し、加熱後のめん類の食感が改善される。この改善効果を発現するのに必要なPL-Aの量は、後に記載する活性測定法で、原料粉1Kgあたり150単位以上、望ましくは200単位以上である。

PL-Aはいずれのものも用いるが動物の胃腸から製造されるパンクレアチン製剤を、PL-A原料として使用できる。いくつかの市販パンクレアチン製剤のPL-A活性を測定した結果を、第1表に示す。

第 1 表

バンクレアチン製剤 (製造者名)	PL-A 活性 (単位/g)
No. 1 (東京化成)	1000
No. 2 (ノボ)	560
No. 3 (協和マイルズ)	960
No. 4 (極東製薬)	310

市販のバンクレアチン製剤中にはプロテアーゼが一般に含まれているがこの酵素は生地及びめんに悪影響を及ぼす。即ち、生地の機械耐性も、めんの食感も低下する。従って、市販バンクレアチン製剤を使用する場合には、あらかじめプロテアーゼを失活させておくことが必要であり、これは、バンクレアチンを酸性下で加熱することにより達成される。その条件は次の通りであるが、この範囲外でも実施可能である。

バンクレアチン濃度	: 10~20 (w/w) %
pH	: 1.5~4.0
加熱温度	: 70~90℃
加熱時間	: 10~40分

## (1) PL-A 活性測定法

本活性測定法は、基質に精製大豆リン脂質混合物を用い、酵素反応によって生成する遊離脂肪酸を、市販の遊離脂肪酸定量キットを用いて定量することに基づく。

第1表に酵素反応液組成を示す。基質であるリン脂質の溶液は、精製大豆リン脂質混合物 (ツルレーシチン社製、商品名SLP-ホワイト) の2% (w/w) 水分散液を高速回転ホモジナイザーで分散させて調整した。

第 1 表

A	0.1% (w/w) PL-A 溶液	0.2mℓ
B	0.1M塩化カルシウム水溶液	0.1mℓ
C	0.2M酢酸-酢酸ナトリウム緩衝液 (pH 5.5)	0.5mℓ
D	脱イオン水	0.2mℓ
E	リン脂質水分散液	1.0mℓ

A, B, C及びDの混合液を30℃で5分間予備加熱した後、同じく30℃で予備加熱したEを加え、30℃で酵素反応を進行させる。10

現在、めん類の品質改良剤として、レシチンが使用されているが、こ

れはPL-Aの基質であり、穀類粉中のリン脂質と同様に、PL-Aの作用を受ける。従って、本発明の実施形態の1つとして、レシチンとPL-Aとを併用すると、PL-Aの改良作用はより強化される。

本発明で使用するPL-Aの工業的原料であるバンクレアチン製剤をバスター類の製造に使用し、弾力性に富み、粘着性の少ないバスター類を得る方法が、米国特許3,520,702 (1970) に開示されている。それによれば、バンクレアチンの添加量は小麦粉1kgあたり、2~100mgで、最も有効な添加量は25mgであるとされている。先に挙げた第1表から明らかなように、最もPL-A活性の高いバンクレアチン製剤を使用しても、その酵素活性量は、最も有効な添加量である25mgを用いた場合、25単位であり、本発明の効果を得るには、はるかに不十分である。また先に記述したように、PL-A活性量として150単位以上に相当する量のバンクレアチン製剤を、酸性加熱処理なしにそのまま用いると、生地及びめんの品質は、無添加の場合よりもむしろ低下する。本発明で採用したPL-A活性測定法は次の通りである。

分後、沸騰水中で15分間加熱して反応を停止させる。反応液20μℓ中に含まれる遊離脂肪酸は、デクミナーNEFA (協和メデックス社製) を用いて定量する。PL-A活性の定義は、1分間に1μMの遊離脂肪酸を生成する酵素活性を1単位とした。

以下に実施例を示す。

## 実施例 1.

第2表に示す処方を用い、第3表に示した3種類のうどんを常法により試作した。

第 2 表

中力小麦粉	9800g
食塩	200g
水	3300g

第 3 表

No. 1	対照試験区 (無添加)
No. 2	対照試験区 (未加熱バンクレアチン 4g添加)
No. 3	本試験区 (PL-A 8g添加)

バンクレアチンは豚バンクレアチン（協和マイルズ製）を用いた。PL-Aとしては、10%（w/w）バンクレアチン分散液を塩酸でPH3.5とした後、75℃で20分間加熱し冷却後、バンクレアチンと同量の乳糖を加えて凍結乾燥したものを用いた。酵素活性は490単位/gである。

No. 1の生地と比較して、No. 3の生地は弾力性に富み、かつ、伸展性に優れ、めんにしたときのめん切れのないめん帯を形成し、機械耐性の良好なめん帯となった。これに対して、No. 2の生地は軟かすぎ、しかも粘着性のあるめん帯となり、No. 1の生地よりも機械耐性に劣っていた。

得られたうどんを、それぞれ98℃で10分間茹でた後、流水で冷却し、その歩留りを測定した。その結果は第4表に示すように、No. 3のうどんが最も高い歩留りを示し、No. 2が最も低かった。

第4表

うどん	歩留り (%)
No. 1	285
No. 2	270
No. 3	300

No. 4の生地と比較して、No. 6の生地は引張り強く柔軟性に富んだめん帯を形成し、めん帯の切れも生ぜず、優れた機械耐性を示した。これに対して、No. 5の生地は、弾力性が失われ粘着性のあるめん帯となり、No. 4の生地よりも機械耐性に劣っていた。

得られた中華めんを98℃で3分間蒸煮後、スープを添加し、専門パネルによりその食感を評価した。更に、1時間室温に放置後、再度食感を評価した。その結果、いずれの場合も、No. 6の中華めんが最も歯ごたえがあり、弾力性に優れていた。これに対して、No. 5の中華めんは最も劣っていた。

また、うどんにスープを加えて、その食感を専門パネルにより評価した。

No. 3のうどんが最も歯ごたえに優れていた。これに対して、No. 2のうどんは軟かすぎて、最も劣っていた。

## 実施例 2.

第5表に示す処方を用い、第6表に示した3種類の中華めんを試作した。

第5表

単強力小麦粉	9850g
かん水（粉末）	100g
食塩	50g
水	3000g

第6表

No. 4	対照試験区（無添加）
No. 5	対照試験区（未加熱バンクレアチン4g添加）
No. 6	本試験区（PL-A8g添加）

バンクレアチン及びPL-Aは、実施例1.と同じ製品を用いた。



## ⑫ 公開特許公報(A)

昭60-78529

⑤ Int.Cl.

A 21 D 8/04  
2/26

識別記号

庁内整理番号

6712-4B  
6712-4B

④ 公開 昭和60年(1985)5月4日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

⑭ 発明の名称 生地

⑰ 特 願 昭58-187757

⑱ 出 願 昭58(1983)10月7日

⑲ 発 明 者 太 田 恵 教 狛江市岩戸北3-6-17

⑲ 発 明 者 井 上 誠 二 郎 町田市旭町3-6-6

⑲ 出 願 人 協和醗酵工業株式会社 東京都千代田区大手町1丁目6番1号

## 明 細 書

## 1. 発明の名称

生地

で上げ、又は、蒸煮後の食味品質低下の抑制等が強く要望されている。

## 2. 特許請求の範囲

フォスフォリパーゼAを小麦粉1Kgあたり150単位以上含有する

小麦粉生地。

これ等の要望に対して、乳化剤、澱粉、蛋白質等の添加が行われている

が、まだ十分な効果を発揮する技術は開発されていない。

## 3. 発明の詳細な説明

本発明はフォスフォリパーゼAを小麦粉1Kgについて150単位以上含有する(以下、PL-Aと略称する)生地に関する。

該生地からめん類例えばうどん、そば、中華めん、マカロニ、スパゲッティ又、ぎょうざ、しょうまいの皮等調製すると優れた効果を奏する。

めん類は代表的な澱粉食品の1つである。近年その生産、流通、消費形態等の変化に伴い、めん類の製造にはいくつかの改善が要望されている。例えば、大量機械生産の際のめん生地への機械耐性の付与、茹でる時の溶出固形分の低下による歩留りの向上と廃水汚染の軽減、さらに茹

穀類粉、特に小麦粉の食品加工適性について検討の結果、穀類粉中のリン脂質にPL-Aを作用させることにより得られる生地の性質、穀類粉のめん類加工適性が向上し、製品品質が改善されることが見い出された。即ち、PL-A添加により、生地の機械耐性が改善されこの生地を用いてめん類を製造しためん類の加熱時の歩留りが向上し、加熱後のめん類の食感が改善される。この改善効果を発揮するのに必要なPL-Aの量は、後に記載する活性測定法で、原料粉1Kgあたり150単位以上、望ましくは200単位以上である。

PL-Aはいずれのものも用いるが動物のすい臓から製造されるパンクレアチン製剤を、PL-A原料として使用できる。いくつかの市販パンクレアチン製剤のPL-A活性を測定した結果を、第1表に示す。

第 1 表

パンクレアチン製剤 (製造者名)	PL-A 活性 (単位/g)
No. 1 (東京化成)	1000
No. 2 (ノボ)	560
No. 3 (協和マイルズ)	960
No. 4 (橋本製薬)	310

市販のパンクレアチン製剤中にはプロテアーゼが一般に含まれているがこの酵素は生地及びめんに影響を及ぼす。即ち、生地の機械耐性も、めんのお感も低下する。従って、市販パンクレアチン製剤を使用する場合には、あらかじめプロテアーゼを失活させておくことが必要であり、これは、パンクレアチンを酸性下で加熱することにより達成される。その条件は次の通りであるが、この範囲外でも実施可能である。

パンクレアチン濃度	: 10~20 (w/w) %
pH	: 1.5~4.0
加熱温度	: 70~90℃
加熱時間	: 10~40分

## (1) PL-A 活性測定法

本活性測定法は、基質に精製大豆リン脂質混合物を用い、酵素反応によって生成する遊離脂肪酸を、市販の遊離脂肪酸定量キットを用いて定量することに基づく。

第1表に酵素反応液組成を示す。基質であるリン脂質の溶液は、精製大豆リン脂質混合物 (ツルレーンチン社製、商品名 SL P-ホワイト) の 2% (w/w) 水分散液を高遠回転ホモジナイザーで分散させて調整した。

第 1 表

A	0.1% (w/w) PL-A 溶液	0.2 ml
B	0.1 M 塩化カルシウム水溶液	0.1 ml
C	0.2 M 酢酸-酢酸ナトリウム緩衝液 (pH 5.5)	0.5 ml
D	脱イオン水	0.2 ml
E	リン脂質水分散液	1.0 ml

A, B, C 及び D の混合液を 30℃ で 5 分間予備加熱した後、同じく 30℃ で予備加熱した E を加え、30℃ で酵素反応を進行させる。10

特開昭60- 78529(2)

現在、めん類の品質改良剤として、レシチンが使用されているが、こ

れは PL-A の基質であり、穀類粉中のリン脂質と同様に、PL-A の作用を受ける。従って、本発明の実施形態の 1 つとして、レシチンと PL-A とを併用すると、PL-A の改良作用はより強化される。

本発明で使用する PL-A の工業的原料であるパンクレアチン製剤をバスター類の製造に使用し、弾力性に富み、粘着性の少ないバスター類を得る方法が、米国特許 3,520,702 (1970) に開示されている。それによれば、パンクレアチンの添加量は小麦粉 1 kg あたり、2~100 mg で、最も有効な添加量は 25 mg であるとされている。先に挙げた第1表から明らかなように、最も PL-A 活性の高いパンクレアチン製剤を使用しても、その酵素活性量は、最も有効な添加量である 25 mg を用いた場合、25 単位であり、本発明の効果を導くには、はるかに不十分である。また先に記述したように、PL-A 活性量として 150 単位以上に相当する量のパンクレアチン製剤を、酸性加熱処理なしにそのまま用いると、生地及びめんのお感も、無添加の場合よりもむしろ低下する。本発明で採用した PL-A 活性測定法は次の通りである。

分後、沸騰水中で 15 分間加熱して反応を停止させる。反応液 20  $\mu$ l 中に含まれる遊離脂肪酸は、デタミナー NEFA (協和メデックス社製) を用いて定量する。PL-A 活性の定義は、1 分間に 1  $\mu$ M の遊離脂肪酸を生成する酵素活性を 1 単位とした。

以下に実施例を示す。

## 実施例 1.

第2表に示す処方を用い、第3表に示した3種類のうどんを常法により試作した。

第 2 表

中力小麦粉	9800 g
食塩	200 g
水	3300 g

第 3 表

No. 1	対照試験区 (無添加)
No. 2	対照試験区 (未加熱パンクレアチン 4 g 添加)
No. 3	本試験区 (PL-A 8 g 添加)

バンクレアチンは豚バンクレアチン（協和マイルズ製）を用いた。PL-Aとしては、10%（w/w）バンクレアチン分散液を塩酸でPH3.5とした後、75℃で20分間加熱し冷却後、バンクレアチンと同量の乳糖を加えて凍結乾燥したものを用いた。酵素活性は490単位/gである。

No. 1の生地と比較して、No. 3の生地は弾力性に富み、かつ、伸展性に優れ、めんにしたときのめん切れのないめん帯を形成し、機械耐性の良好なめん帯となった。これに対して、No. 2の生地は軟かすぎ、しかも粘着性のあるめん帯となり、No. 1の生地よりも機械耐性に劣っていた。

得られたうどんを、それぞれ98℃で10分間茹でた後、流水で冷却し、その歩留りを測定した。その結果は第4表に示すように、No. 3のうどんが最も高い歩留りを示し、No. 2が最も低かった。

第4表

うどん	歩留り (%)
No. 1	285
No. 2	270
No. 3	300

No. 4の生地と比較して、No. 6の生地は引張りに強く柔軟性に富んだめん帯を形成し、めん帯の切れも生ぜず、優れた機械耐性を示した。これに対して、No. 5の生地は、弾力性が失われ粘着性のあるめん帯となり、No. 4の生地よりも機械耐性に劣っていた。

得られた中華めんを98℃で3分間茹煮後、スープを添加し、専門パネルによりその食感を評価した。更に、1時間室温に放置後、再度食感を評価した。その結果、いずれの場合も、No. 6の中華めんが最も歯ごたえがあり、弾力性に優れていた。これに対して、No. 5の中華めんは最も劣っていた。

また、うどんにスープを加えて、その食感を専門パネルにより評価した。

No. 3のうどんが最も歯ごたえに優れていた。これに対して、No. 2のうどんは軟かすぎて、最も劣っていた。

## 実施例 2.

第5表に示す処方を用い、第6表に示した3種類の中華めんを試作した。

第5表

単強力小麦粉	9850g
かん水（粉末）	100g
食塩	50g
水	3000g

第6表

No. 4	対照試験区（無添加）
No. 5	対照試験区（未加熱バンクレアチン 4g添加）
No. 6	本試験区（PL-A 8g添加）

バンクレアチン及びPL-Aは、実施例1.と同じ製品を用いた。

